

## [オキノーム散]



痛みをとったり、呼吸を楽にする速効性のあるお薬です。

- ・ 服用後効果が出るまでに 15～30 分時間がかかります。
  - ・ 作用時間は 4～6 時間程度ですが、個人差があります。
  - ・ 1 日に服用できる回数の制限はありません。
  - ・ お薬を飲んで、60 分しても効果の無いときには再度オキノーム散を内服してください。
- ☆ 服用しても症状が緩和されないとき、1 日 6 回以上服用しても症状が続くときはご相談ください。
- ☆ 副作用として便秘・はき気・眠気があります。
- ・ 便秘は下剤を使用し、排便コントロールをおこなってください。
  - ・ 症状がある時にオキノーム散をノバミン錠 5mg 1 錠(はき気止め)と一緒に服用してください。
  - ・ はき気は 1～2 週間で治まりますが、その間は、はき気を予防する薬(ノバミン錠: 白い錠剤)を服用してください。但し、1 度目のオキノーム散から 6 時間以内に繰り返しオキノーム散を飲むときにはノバミン錠を内服する必要はありません。6 時間以上間隔があいているようでしたら、ノバミン錠も一緒に内服してください。
  - ・ 眠気やめまいが起こることあるため、車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。