

[オプソ内服液]



痛みをとったり、呼吸を楽にする速効性のあるお薬です。

- ・ 服用後効果が出るまでに 15～30 分時間がかかります。
 - ・ 作用時間は 3～5 時間程度ですが、個人差があります。
 - ・ 1 日に服用できる回数の制限はありません。
 - ・ お薬を飲んで、60 分しても効果の無いときには再度オプソ内服液を内服してください。
- ☆ 服用しても症状が緩和されないとき、1 日 6 回以上服用しても症状が続くときはご相談ください。
- ☆ 副作用として便秘・はき気・眠気があります。
- ・ 便秘は下剤を使用し、排便コントロールをおこなってください。
 - ・ 症状のある時にオプソ内服液とノバミン錠 5mg 1 錠(はき気止め)と一緒に服用してください。
 - ・ はき気は 1～2 週間で治まりますが、その間は、はき気を予防する薬(ノバミン錠: 白い錠剤)を服用してください。但し、1 度目のオプソ内服液から 6 時間以内に繰り返しオプソ内服液を飲むときにはノバミン錠を内服する必要はありません。6 時間以上間隔があいているようでしたら、ノバミン錠も一緒に内服してください。
 - ・ 眠気やめまいが起こることあるため、車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。